

CATÁLOGO DE CULTIVARES DE AGUACATERO (*PERSEA AMERICANA* MILL.) EN CUBA

A-38

N. N. Rodríguez-Medina¹, V. R. Fuentes-Fiallo¹, J. B. Velázquez-Palenzuela¹, G. L. González-García¹, D. G. Sourd-Martínez¹, J. A. Rodríguez-Rodríguez¹ e I. M. Ramírez-Pérez².

¹ Instituto de Investigaciones en Fruticultura Tropical. Ave 7^{ma} NO. 3005, e/ 30 y 32, Miramar, Playa, Ciudad de La Habana, Cuba. E-mail: iiCIF@ceniai.inf.cu.

² Centro de Estudios Aplicados al Desarrollo Nuclear. Calle 30 No. 502 e/ 5^{ta} y 7^{ma}, Miramar, Playa, Ciudad de La Habana, Cuba. E. Mail: fuentes@ceaden.edu.cu.

A pesar de que el aguacatero (*Persea americana* Mill.) forma parte de la flora cubana desde hace más de 400 años, no es hasta posterior a 1904, con la fundación de la Estación Experimental Agronómica de Santiago de Las Vegas, que comenzó a llamar la atención de los agricultores de los municipios más cercanos a La Habana. Con la fundación del Banco de Germoplasma de Frutales Tropicales y Subtropicales en 1965 (actual Instituto de Investigaciones en Fruticultura Tropical), que se nutrió de otras colecciones ya establecidas y de prospecciones a lo largo y ancho de la Isla, se creó la colección más grande del país. Como parte de los resultados obtenidos en la evaluación de la colección de aguacateros, se ofrece la caracterización de 21 cultivares mediante la utilización de los descriptores propuestos por el Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos y de otros establecidos por los autores. La información se ofrece en forma de un Catálogo que brinda para cada cultivar fotos a color de las ramas jóvenes y del fruto, tanto entero, como abierto, así como los 92 descriptores evaluados: 65 cualitativos y 27 cuantitativos (promedio de 20 mediciones). En notas adicionales se ofrece información sobre la raza, grupo dicogámico, origen y algunas características distintivas del cultivar. Los cultivares seleccionados son: 'Amado Gómez No. 1', 'California', 'Casimiro', 'Catalina', 'Centro América No. 3', 'CH 1 No. 3', 'Chavao No. 3', 'Choquette', 'Darío', 'Duke 7', 'Govín', 'Hass', 'Itzamná', 'Jaruco No.1', 'José Antonio', 'Los Moros', 'Lula', 'Miguel García', 'Monroe (Estación)', 'Sicilia No. 6', 'Suardía' y 'Wilson Popenoe'. Ellos pertenecen a distintas razas y grupos dicogámicos y su cultivo permite la obtención de frutos maduros prácticamente durante todo el año, lo que unido a sus excelentes rendimientos y a la calidad de sus frutos los hace idóneos para la producción de aguacates en el país. Este Catálogo constituye un manual de obligada consulta para investigadores, productores, docentes y estudiantes.